

# LACTARIUS TORMINOSUS (Schaeffer : Fries) S.F. Gray



## BIBLIOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 400

- Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 20  
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 82  
Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 108  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1522  
Heim, 1969, Champignons d'Europe : 37, 352, 363  
Kühner, 1975, Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-1 : 34  
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 474  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : 533, 779  
Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 54  
Moreau Claude, 1978, Larousse des champignons : 192  
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 884  
Phillips, 1981, Les champignons : 79  
Poëlt & Jahn, 1964, Champignons d'Europe : Planche 168  
Ricken, 1915, Die Blätterpilze : p. 27, n° 87  
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 1 : 8

## ICONOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 402, 403, 784

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 83  
Bresadola (Réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 357  
Caspari, 1964, Champignons d'Europe : Planche 168  
Cetto, 1970, Funghi dal vero, 1 : 174  
Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 108, 109  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1522  
Dähnecke, 1993, 1200 Pilze : 942  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : Tav. 169 A  
Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 54  
Moreau Claude, 1978, Larousse des champignons : 192  
Phillips, 1981, Les champignons : 78  
Ricken, 1915, Die Blätterpilze : Taf. 9, Fig. 3  
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 1 : 8  
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 562  
Schlittler, 1972, Les champignons à lamelles : 89

## DESCRIPTION :

**Chapeau** de 4 à 12 cm de diamètre, convexe puis **étalé-déprimé**, souvent ombiliqué dans la dépression, **incarnat roussâtre** à briqueté orangé ou nuancé de rosâtre, **faiblement zoné** de rose roussâtre sombre, visqueux au centre par temps humide.

**Marge** plus claire, longtemps **enroulée**, mince, excédante, **fortement barbue-laineuse**.

**Lames** serrées, assez étroites, minces, décurrentes, fourchues, **blanchâtres à crème rosé**.

**Arête** aiguë, entière, **concolore**.

**Stipe** de 3 - 7 x 1 - 2 cm, **court**, inférieur au diamètre du chapeau, évasé au sommet, vite creux, cassant, blanc crème à beige carné, **subconcolore** au chapeau, +/- scrobiculé de rosâtre.

**Chair** épaisse, **dure**, blanchâtre à **saumon pâle**, rosâtre sous la cuticule.

**Latex** immuable ou **jaunissant lentement sur le mouchoir**, très **âcre**.

**Saveur** franchement **âcre** - **Odeur** faiblement **fruitée**, de pomme ou subpélargoniée.

**Habitat** strictement **sous bouleaux**.

**Spores** subglobuleuses à **largement ellipsoïdes**, crêtées-zébrées à subréticulées, de **8 - 10 x 5 - 7  $\mu$** .

**Sporée** **crème** à peine rosée.

**Cystides** fusiformes, de 60 - 80 x 8 - 10  $\mu$ .

**Basides** tétrasporiques.

**Epicutis** **filamenteux**, gélifié, à hyphes de **3 à 5  $\mu$**  de large.

**OBSERVATIONS** : Liée aux bouleaux, cette espèce est bien reconnaissable à son chapeau orange briqueté, à marge fortement laineuse.

**Kühner & Romagnesi** distinguent une variété « typicus » de couleurs pâles, à spores de 6 - 9 x 4 - 6  $\mu$ , et une variété « sublaterit » très colorée à spores plus grandes, de 8 - 10 x 6 - 7  $\mu$  - **Bon** ramène ces deux variétés au type.

### Microscopie d'après Maria Teresa Basso

