

LACTARIUS QUIETUS (Fries : Fries) Fries



BIBLIOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 500

- Bertault, 1978, Bulletin de la Société Mycologique de France, 94-3 : 281
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 57
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 90
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (Réimp. 1982) : planche 51
Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 141
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1581
Heim, 1969, Champignons d'Europe : 359
Henze, 1965, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 17 : 16
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 481
Marchand, 1980, Champignons du Nord et du Midi, 6 : 556
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : 541, 790
Moreau Claude, 1978, Larousse des champignons : 193
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 902
Phillips, 1981, Les champignons : 87
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 1 : 21

ICONOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 503, 822

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 91
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 1 (Réimp. 1981) : planche 51
Bresadola (Réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 376
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 629
Cléménçon et al., 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 141
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1581
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 985
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : Tav. 176 E
Marchand, 1980, Champignons du Nord et du Midi, 6 : 556
Moreau Claude, 1978, Larousse des champignons : 193
Phillips, 1981, Les champignons : 88
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 1 : 21
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 577

DESCRIPTION :

Chapeau de 2 à 8 cm de diamètre, convexe puis aplani et étalé +/- déprimé, non mamelonné, **micacé-pruineux**, sec, mat, **brun roussâtre** à beige ochracé roussâtre, assez terne, +/- **zoné ou taché-guttulé** de brun roussâtre.

Marge régulière puis ondulée-lobée, parfois brièvement cannelée.

Lames adnées, minces, arquées, **adnées-décurrentes par la dent**, crèmes puis roussâtres, souvent tachées de brun rouillé.

Arête aiguë, entière, concolore puis roussâtre.

Stipe de 2 - 6 x 06 - 1,5 cm, fusiforme ou atténué de haut en bas, **bosselé**, plein puis farci-spongieux, **subconcolore** au chapeau, souvent **vineux sombre** à la base.

Chair tendre, blanchâtre à **crème orangé**, roussissante au contact de l'air.

Latex copieux, blanc crème, laiteux, **doux, immuable**.

Odeur forte et caractéristique de **punaise des bois** - **Saveur** douce à **amarscente**, astringente.

Habitat sous **chênes** (exclusivement ?), en terrain **calcaire**.

Spores de 8 - 9 x 6 - 7 μ , subréticulées (23 CD).

Sporée crème rosé pâle.

Cheilocystides nombreuses, banales.

Pleurocystides plus rares.

Epicutis constitué d'hyphes dressées, parfois fusiformes.

OBSERVATIONS : Espèce de taille moyenne liée aux chênes, reconnaissable sur le terrain à sa forte odeur de punaise des bois, à son chapeau brun roussâtre givré-pruineux (bave d'escargot) et indistinctement zoné, à son lait doux, blanc crème et immuable, enfin à ses lames décourbées par la dent.

Microscopie d'après Maria Teresa Basso

