

PEZIZA PHYLLOGENA Cooke



SYNONYMES : *Peziza badioconfusa* Korf sensu auct.

BIBLIOGRAPHIE : Boudier, 1905-1910, *Icones Mycologicae*, 4 (Réimp. 1982) : planche 282 (sn. *Galactinia olivacea*)
Donadini, 1979, *Documents Mycologiques*, 37-38 : 50 (sn. *Peziza badioconfusa*)
Ellis M.B. & Ellis J.P., 1988, *Microfungi on miscellaneous substrates* : p. 88, fig. 256 (sn. *Peziza badioconfusa*)
Le Gal & Moser, 1981, *Bulletin de la Société Mycologique de France*, 97-2 : (105) (sn. *Peziza badioconfusa*)
Moser, 1963, *Kleine Kryptogamenflora*, 2 A (traduction française) : 100 (sn. *Peziza badioconfusa*)
Nordic Macromycètes - Vol. 1 (Ascomycètes) : p. 61
Péan & Mornand, 1999, *Documents Mycologiques*, 113 : 15 (sn. *Peziza badioconfusa*)
Romagnesi, 1978, *Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie*, 70 : 22 (sn. *Peziza badioconfusa*)

ICONOGRAPHIE : Boudier, 1905-1910, *Icones Mycologicae*, 2 (Réimp. 1981) : planche 282 (sn. *Galactinia olivacea*)
Bresadola, 1930, *Iconographia Micologica*, 5 : 1211 (sn. *Aleuria olivacea*)
Cetto, 1979, *I Funghi dal vero*, 3 : 1220 (sn. *Peziza badioconfusa*)

DESCRIPTION :

Fructifications cupulées, sessiles, de 3 à 8 cm de diamètre.

Marge à peine dentée.

Hyménium de couleur olivâtre ou marron, parfois à reflets rougeâtres.

Surface externe furfuracée, concolore à l'hyménium.

Chair assez épaisse, gris lilacin à violette, blanchâtre en séchant.

Habitat souvent dans les forêts sablonneuses.

Spores elliptiques-allongées à subfusiformes, guttulées dans la jeunesse, finement verruqueuses, à verrues irrégulières, hyalines, de 17 - 21 x 8 - 10 µ.

Asques octosporés, à spores unisériées, de 250 - 350 x 14 µ, bleuisant dans le Melzer.

Paraphyses grêles, à peine épaissies au sommet, septées et nébuleuses intérieurement.

OBSERVATIONS : Espèce ubiquiste plutôt rare, caractérisée par ses nuances olivacées et sa chair violette , par ses spores verruqueuses et par ses asques bleuisant dans le melzer.

MICROSCOPIE D'APRES ELLIS ET AL

