

LACTARIUS DETERRIMUS Gröger



SYNONYMES : *Lactarius deliciosus* variété *piceus* Smotlacha

BIBLIOGRAPHIE : Anonyme, 1980, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 79 : 8 (clé)

Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 32

Basso M. T., 1999, Lactarius : 262

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 80

Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 2 : 286

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1556

Marchand, 1980, Champignons du Nord et du Midi, 6 : 524

Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 887

Phillips, 1981, Les champignons : 80

ICONOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 265

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 81

Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 621 (sn. *Lactarius deliciosus* variété *piceae*)

Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 2 : 286, 287

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1556

Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 954

Marchand, 1980, Champignons du Nord et du Midi, 6 : 524

Phillips, 1981, Les champignons : 81

Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 563

DESCRIPTION :

Chapeau de 4 à 10 cm de diamètre, plat ou légèrement creux à un peu infundibuliforme à la fin, peu visqueux, **orangé vif** à orange carné, **vite verdissant**, à **zonation serrée** surtout vers la marge, parfois peu évidente.

Marge aiguë, peu enroulée, parfois incisée.

Lames assez serrées, **orangées**, plutôt étroites, arquées à subdécurrentes

Arête aiguë, entière, concolore.

Stipe de 3 - 6 x 1 - 2,5 cm, subégal ou atténué vers la base, **concolore** au chapeau, **entièrement verdissant**, généralement **non scrobiculé**, pruneux.

Chair orangée ou couleur carotte puis **verdissante**, **peu ferme**, blanchâtre dans la moelle du stipe.

Latex peu abondant, orange, longtemps **immuable** puis rougissant, doux puis un peu amer.

Odeur de scléroderme ou subpélargoniée - **Saveur** douce à amarescente.

Habitat exclusivement sous **épicéas**.

Spores de 9 - 10 x 7 - 8 μ , crêtées, avec de nombreuses verrues libres.

Sporée ocre pâle.

Cystides à sommet pluriétranglé.

Epicutis filamenteux, faiblement gélifié, composé d'hyphes septées larges de 2 à 5 μ .

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par son habitat sous épicéas, par son chapeau peu zoné, orangé et vite verdissant, son pied non scrobiculé, souvent cerné de blanc sous les lames et par sa chair peu ferme.

Microscopie d'après Maria Teresa Basso

