

MORCHELLA ROTUNDA (Persoon : Fries) Boudier



SYNONYMES : *Morchella esculenta* variété **rotunda** Persoon

BIBLIOGRAPHIE : Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 326

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (Réimp. 1982) : planche 195

Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 4 (sn. *Morchella esculenta* variété *rotunda*)

Cléménçon et al., 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 39

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 13

Grelet, Réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p. 7 n° 2

Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 92 (sn. *Morchella esculenta* variété *rotunda*)

Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction française) : 85 (sn. *Morchella esculenta* variété *rotunda*)

ICONOGRAPHIE : Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 328

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2 (Réimp. 1981) : planche 195

Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 4 (sn. *Morchella esculenta* variété *rotunda*)

Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 359

Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 39

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d'Europe : 13

Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 92 (sn. *Morchella esculenta* variété *rotunda*)

Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 608

DESCRIPTION :

Chapeau de 4 à 9 cm de haut et 5 - 10 cm de large, irrégulièrement **sphérique** à ovoïde, souvent **plus large que haut, creux**, étroitement **adné**, d'un beau **jaune ochracé saturé**.

Alvéoles **profonds**, gauffrés, **amples, irréguliers**, très ouverts, **confus**, limités par des arêtes **minces** et très fragiles.

Pied lisse, **blanc-ochracé**, tendre, très **fragile**, furfuracé ou **granuleux**, renflé et +/- ridé à la base, **creux**.

Chair tendre, très **fragile**, **concolore** au pied.

Saveur douce - **Odeur** agréable, faible.

Habitat d'Avril à Mai en plaine et jusqu'en Juin en montagne, dans les forêts herbeuses, souvent au voisinage des **frênes**, dans les lisières thermophiles, indifférentes au substrat.


Spores lisses, largement **elliptiques**, hyalines, de 18 - 23 x 11 - 14 µ.

Asques octosporés, de 300 - 400 x 17 - 22 μ , non bleussant dans le Melzer.

Paraphyses septées, ramifiées, renflées au sommet jusqu'à 20 μ .

OBSERVATIONS : Espèce commune mais variable de forme et de couleur; elle se reconnaît à la forme typique de son chapeau, à sa couleur d'un blond chaud, à ses alvéoles amples et en désordre, à sa chair très fragile, enfin à sa poussée relativement tardive pour une Morille.

MICROSCOPIE D'APRES BREITENBACH & KRÄNZLIN



- A: Spores lisses, largement elliptiques, hyalines, 18 - 23 x 11 - 14 μ , et pourvues, occasionnellement, de fines gouttelettes aux extrémités (externes).
- B: Asques octosporés, (280) 330 - 380 x (15) 17 - 22 μ ; J-.
- C: Les paraphyses sont septées, ramifiées et renflées au sommet jusqu'à 20 μ .