

## TUBER MESENERICUM *Vittadini*



**BIBLIOGRAPHIE** : Gross, 1991, Documents Mycologiques, 81 : 3

Montecchi & Lazzari, 1993, Fungi ipogei : 161

Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction française) : 78

**ICONOGRAPHIE** : Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1659

Montecchi & Lazzari, 1993, Fungi ipogei : 160

### **DESCRIPTION** :

**Carpophore** sensiblement **globuleux**, de forme +/- régulière mesurant **5 à 6 cm** de diamètre, **brun rouge foncé** à brun noir, parfois à **reflets bleutés**, tesselé, orné de **verrues pyramidales** de 2 - 4 mm, à 5 angles de 1 - 2 mm de hauteur, comportant une **profonde dépression** basale pouvant atteindre la taille d'une noix.

**Gléba** blanche puis **gris marron** sombre à maturité, charnue, **veinée de blanc**.

**Odeur forte** - **Saveur** plutôt **amère**.

**Habitat** **sous terre**, dans les bois de feuillus, sous les buissons, en automne et en hiver.

**Spores** de 27 - 53 x 23 - 37  $\mu$ , sphériques à ellipsoïdes, ornées d'un réseau à **mailles de plus de 8  $\mu$**  de diamètre et de 4 - 5  $\mu$  de haut.

**Asques** en forme de **sac**, **globuleuses**, contenant généralement de **4 à 6 spores**.

**OBSERVATIONS** : Proche de *Tuber aestivum* dont elle se distingue par son odeur forte et par un carpophore à verrues pyramidales plus pointues. Microscopiquement les spores sont beaucoup plus grandes et possèdent un réseau plus dense et irrégulier.



