

LACTARIUS DELICIOSUS (Linné : Fries) S.F. Gray



BIBLIOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 253

- Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 30
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 80
Bouchardy, 1966, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 20 : 21
Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 2 : 287
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1551
Flahaut, 1967, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 27 : 12
Girel, 1973, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 48 : 7
Heim, 1969, Champignons d'Europe : 352, 353
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 474
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : 543, 793
Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 51
Moreau Claude, 1978, Larousse des champignons : 185
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 887
Phillips, 1981, Les champignons : 80
Poëlt & Jahn, 1964, Champignons d'Europe : Planche 165
Raris, 1973, Les champignons : 82
Ricken, 1915, Die Blätterpilze : p. 31, n° 100
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 1 : 7

ICONOGRAPHIE : Basso M. T., 1999, Lactarius : 257, 776

- Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 81
Bresadola (Réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 373
Caspary, 1964, Champignons d'Europe : Planche 165
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 166
Cléménçon et al, 1980, Les quatre saisons des champignons, 2 : 287
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France et d'Europe : 1551
Dähnecke, 1993, 1200 Pilze : 949
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (Réimp. 1994) : Tav. 177 A
Marchand, 1971, Champignons du Nord et du Midi, 1 : 51
Moreau Claude, 1978, Larousse des champignons : 185
Phillips, 1981, Les champignons : 81
Raris, 1973, Les champignons : 82
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 1 : 7
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 563
Schlittler, 1972, Les champignons à lamelles : 91

DESCRIPTION :

Chapeau de 6 à 10 cm de diamètre, convexe à étalé et +/- déprimé ou ombiliqué, peu visqueux, plutôt rugulo-givré, zoné par de taches concentriques imbues subscriboulées, orangé brunâtre ou rougeâtre sur fond ocre orangé ou briqueté pâle.

Marge enroulée, plutôt mince, ondulée avec l'âge, entière, pruinuse, à zonation plus étroite.

Lames orangé pâle, peu serrées, **étroites**, un peu décurrentes, arquées, parfois **verdissantes**.

Arête aiguë, entière ou finement érodée, concolore.

Stipe de 3 - 5 x 1 - 2,5 cm, **court** et conique, souvent atténué à la base, vite creux, **subconcolore** et +/- **scrobiculé**.

Chair orangée puis blanchâtre, **peu verdissante**, assez épaisse, floconneuse, ferme, cassante.

Latex orangé vif.

Odeur fruitée, de carotte fraîche - **Saveur** douceâtre.

Habitat sous **pins**, sur sol calcaire ou acide.

Spores de 7 - 9 x 5,5 - 6,5 μ , arrondies ou ellipsoïdes, crêtées à subréticulées par de fins connexifs.

Sporée jaunâtre pâle.

Basides tétrasporiques.

Cheilocystides assez abondantes, acuminées, souvent appendiculées au sommet.

Cuticule filamenteuse, à épicutis **gélifié** et hyphes larges de 2 à 4 μ .

OBSERVATIONS : Espèce commune liée aux pins, souvent confondue avec les autres lactaires à lait rougissant, mais bien caractérisée par son habitat, son chapeau zoné d'aspect +/- givré, son pied peu scrobiculé, enfin par son lait rouge carotte et immuable.

Microscopie d'après Maria Teresa Basso

